

## Ce que vous devez savoir si vous prenez des médicaments pour traiter la tuberculose.



### Prendre des médicaments pour tuer les germes de la tuberculose peut guérir la maladie tuberculose.

Les germes de la tuberculose sont résistants. Vous devrez prendre des médicaments pendant de nombreux mois pour être certain de tuer tous les germes de la maladie. Suivez les consignes que vous donnera le personnel soignant pour prendre vos médicaments. N'oubliez pas de prendre vos médicaments. Votre personnel soignant vous parlera de la **Thérapie d'Observation Directe (TOD)**. La TOD signifie que le personnel soignant est avec vous au moment où vous prenez vos médicaments contre la tuberculose. La TOD peut se faire au moment qui vous convient et à l'endroit de votre choix. La TOD vous simplifie la prise de vos médicaments contre la tuberculose.

### N'arrêtez pas la prise de vos médicaments trop tôt.

- Perte d'appétit
- Vomissements
- Douleurs d'estomac
- Nausées
- Coloration jaune des yeux ou de la peau
- Troubles ou modifications de la vue
- Sensations de vertige
- Douleurs articulaires
- Fièvre pendant 3 jours et plus
- Éruption cutanée
- Saignements intempestifs
- Apparition inexplicable de bleus sur la peau

### Si vous prenez de la Rifampine, sachez que:

- vos urines, votre salive ou vos larmes peuvent se colorer en orange.
  - vos lentilles de contact souples peuvent se tacher
- Cela peut arriver **très rapidement** ! Ne portez pas de lentilles de contact souples si vous prenez de la Rifampine.
- votre peau peut devenir plus sensible au soleil. Utilisez une crème de protection solaire sur les parties de la peau qui sont exposées au soleil.
  - certains moyens contraceptifs **ne fonctionnent pas aussi bien** sous prise de Rifampine. Les

Même si vous vous sentez mieux au bout de quelques semaines, la tuberculose peut revenir. Vous pouvez aussi transmettre la tuberculose à votre entourage.

### Rappelez-vous de ce qui suit, lorsque vous prenez vos médicaments contre la tuberculose :

Si vous prenez **d'autres** médicaments ou si vous prenez des vitamines, des décoctions médicinales ou autres, que vous avez achetées sans ordonnance, parlez-en au personnel soignant. Évitez de boire de la bière, du vin ou des alcools forts pendant la période où vous prenez vos médicaments contre la tuberculose. Prévenez le personnel soignant si vous êtes enceinte, si vous allaitez ou si vous prenez un contraceptif oral. Prévenez votre personnel soignant, si vous avez d'autres problèmes de santé que la tuberculose.

Les médicaments habituels contre la tuberculose :

- Isoniazide (INH)
- Rifampine
- Pyrazinamide (PZA)
- Ethambutol

### Les médicaments contre la tuberculose sont habituellement sans risque.

Très peu de personnes présentent des effets secondaires. Si vous présentez l'un des signes mentionnés dans la liste ci-après, vous devez immédiatement prévenir le personnel soignant.

- Fourmillement dans les doigts ou les orteils
- Fourmillements ou sensation d'engourdissement autour de la bouche.

femmes devront utiliser un moyen contraceptif de remplacement, comme le préservatif pendant leur période de prise de Rifampine.

Pour toute question, merci de bien vouloir prendre contact avec votre médecin ou votre service de santé.

Protégez-vous et protégez aussi votre famille et vos amis contre la tuberculose.

### Allez jusqu'au bout de votre traitement contre la tuberculose!

Text - TB Control and Prevention Program, Division of Disease Prevention, Virginia Department of Health 11/8/02  
[www.vdh.virginia.gov/epidemiology/DiseasePrevention/Programs/Tuberculosis/index.htm](http://www.vdh.virginia.gov/epidemiology/DiseasePrevention/Programs/Tuberculosis/index.htm)

This work is licensed under the Creative Commons AttributionNonCommercial-NoDerivs License  
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/>

A Healthy Roads Media project

[www.healthyroadsmedia.org](http://www.healthyroadsmedia.org)

What You Should Know About Taking Tuberculosis Medicines – French  
(Last Reviewed 10/06)